



সূচীপত্র



মুখ্য পৃষ্ঠা

নিয়মীয়া আহ (বোৱা পদ্ধতি)
শালিধান
নিয়মীয়া আহ সিঁচা পদ্ধতি
ধেমচি
লুৰ্চান
ঘাঁহ জাতীয় শস্য
মিলেট ক্ৰাউন
মিশ্ৰিত সাৰ
সুৰাবুল
চয়াবিন
চিটেবীয়া ঘাঁহৰ খেতি
দীন নাখ ঘাঁহৰ খেতি
কপাহৰ খেতি
লেচেৰা মাহ আৰু ৰাইচবিনৰ খেতি
মেষ্টা খেতি
মৰাপাট বীজৰ খেতি
ৰিহা খেতি
টিআ'চিনিট
উদ্ভিদ ৰোগৰ জৈৱিক নিয়ন্ত্ৰণ
চীনা বাদাম

লেচেৰা মাহ (গৰুৰ খাদ্য হিচাবে) আৰু ৰাইচবিনৰ খেতি

অনুমোদিত জাত :

লেচেৰা মাহ = নং ১০, নং ৪২/১, ই-চি ৪২১৬

ৰাইচবিন = কে-১

পথাৰ প্ৰস্তুতি : পানী জমা হব নোৱাৰা বা ওলাই যাব পৰা মাটি নিৰ্বাচন কৰিব লাগে। মোল্ডবোর্ড নাঙলৰ দ্বাৰা হাল বাই ২-৩ বাৰ মৈয়াই মাটিডৰা প্ৰস্তুত কৰি লব লাগে।

বীজ সিঁচাৰ সময় : এপ্ৰিল-মে'।

বীজৰ পৰিমাণ :

লেচেৰা মাহ = প্ৰতি হেক্টৰত ৫০ কি:গ্ৰাম।

ৰাইচবিন = প্ৰতি হেক্টৰত ২৫ কি:গ্ৰাম।

দূৰত্ব :

শাৰীৰ মাজত ৩৫ ছে:মিটাৰ।

গছৰ মাজত ১০ ছে:মিটাৰ।

সাৰ প্ৰয়োগ : হেক্টৰে প্ৰতি ৩-৪ টন নাইবা বিঘাই প্ৰতি ৪-৬ কুইন্টল পচন সাৰ বা পামজাত সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব।

ফুষ্টি	পৰিমাণ	সাৰ	সাৰৰ পৰিমাণ (কি:গ্ৰাম)	
			হেক্টৰত	বিঘাত
নাইট্ৰজেন	২০	ইউৰীয়া	৪৪	৬
ফছফৰাছ	৪০	একক চুপাৰ ফছফেট	২৪৮	৩৫
পটাছ	২০	মিউৰেট অৱ পটাছ	৩২	৫

শস্য চপোৱা / কটা : বীজ সিঁচাৰ ৭০ দিনৰ পিছত।

সেউজীয়া ঘাঁহৰ উৎপাদন : প্ৰতি হেক্টৰত ২০-২৫ টন।