

## গাহৰি পালনৰ বিভিন্ন দিশসমূহ

- ৩। জহৰ বাত ১- আক্ৰান্ত গাহৰিবোৰৰ জ্বৰ উঠে আৰু খোৰাবলৈ ধৰে। ভৰিৰ ওপৰভাগ ফুলি উঠি কলা পৰে। জ্বৰৰ ও এণ্টিবায়টিক বেজি দি চিকিৎসা কৰিলে বেমাৰ ভাল হয়। প্ৰতিবছৰে ছিটা দি এই বেমাৰৰো প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি।
- ৪। চবকা ১- ভাইৰাচৰ দ্বাৰা হোৱা এই ৰোগত গাহৰিৰ প্ৰথমতে জ্বৰ উঠে, মুখ আৰু ভৰিৰ বুড়াৰ মাজত ঘাঁ লাগে আৰু পানীজোলা বান্ধে। মুখৰ পৰা লেলাবতী ওলাই আৰু খাব নোৱাৰা হয়। এনে গাহৰিক শুকান পৰিষ্কাৰ জেগাত ৰাখি মুখত বৰ'লীচাৰীপ আৰু ভৰিত পটাচপানীৰে ধুই কামত হিমাক্স লগাব লাগে। গাহৰিক এই ৰোগৰ চিটা দিয়াতো বাধ্যতামূলক।
- ৫। গাহৰি জ্বৰ বা কলেৰা ১- ই গাহৰিৰ সবাতোকৈ মাৰাত্মক সংক্ৰামক ৰোগ। দানা পানী খোৱা বন্ধ কৰি ইহঁতৰ জ্বৰ উঠে, চকুত ফেচকুৰী ওলাই আৰু পটা দুটা লাগি ধৰে। প্ৰথমৰহাত সৌচ কৰিব নোৱাৰা হৈ পিছলৈ ডায়েৰিয়া হ'ব পাৰে। দুমাহ বয়সৰ ওপৰৰ সকলো গাহৰিকে এই ৰোগৰ চিটা দিব লাগে। এমাহৰ মূৰত পুনৰাই চিটা দি আকৌ বছৰৰ মূৰত দিব লাগে।
- ৬। গাহৰি পোৱালীৰ চেৰণী ৰোগ ১- কুমলীয়া গাহৰি পোৱালীত হোৱা এনে বেমাৰত প্ৰথমে হালধীয়া পনীয়া পায়খানা হয় আৰু পিছলৈ পায়খানা মটীয়া ৰঙৰ হয় আৰু খাদ্য খাবলৈ এৰি শুকাই-খীনাই মৃত্যু মুখত পৰে। সকলো সময়তে পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখি আৰু পোৱালীৰ দনাত টেটাইক্লিন জাতীয় এণ্টিবায়টিক ব্যৱহাৰ কৰি এই ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি।
- ৭। ৰক্তহীনতা ১- গাহৰিৰ পোৱালীবোৰ এই ৰোগত ভোগে আৰু ইয়াৰ কাৰণ হ'ল মাকৰ গাখীৰত লৌহ মৌলৰ অভাৱ। সেয়ে পোৱালীক জন্মৰ ৪ দিন আৰু ১৪ দিন বয়সত একোটাকৈ ইনফেৰণ নামৰ বেছি দিব লাগে।  
ইয়াৰোপৰি গাহৰিবোৰক স্বাস্থ্যবান কৰি ৰাখিবলৈ দুমাহ মান বয়সত এবাৰ আৰু প্ৰতি তিনিমাহ বয়সৰ মূৰে মূৰে পেলুৰ ঔষধ খুৱাব লাগে। এনে কৰিলে গাহৰিৰ পেতত হোৱা পেলুৰ উপৰিও বহি পৰজীৱি যেনে- ওকনি, চিকাৰ আদিৰ লগতে সচৰাচৰ দেখা দিয়া কাঁহৰ প্ৰকোপৰ পৰা ৰক্ষা পৰে। প্ৰতিবাৰতে বেলেগ বেলেগ পেলুৰ ঔষধ খুৱাব লাগে আৰু ঔষধ খুওৱাৰ পাছত ৪-৫ দিনৰ বাবে এটা লিভাৰ টনিক খুৱাব লাগে।



ডাঃ অসীম কুমাৰ শইকীয়া  
ড° বিজুস্মিতা শৰ্মা ডেকা



### সম্পাদনা সমিতি —

- সম্পাদক : ড° বিজুস্মিতা শৰ্মা ডেকা  
সহঃ সম্পাদক : ডাঃ অসীম কুমাৰ শইকীয়া  
সদস্য : শ্ৰীমতী হাট্টেৰ দাস, শ্ৰী স্বপন কুমাৰ শৰ্মা



কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ, ধেমাজি  
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়  
চিলাপথাৰ



(জনজাতীয় উপ-আঁচনিৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় গুৰু ভূমি কৃষি গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান,  
ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা পৰিষদৰ আৰ্থিক অনুদানত মুদ্ৰিত)

গাহৰি এনে এবিধ জীৱ যি একেবাৰতে বহু সংখ্যক (১৪-১৫টা পৰ্যন্ত) পোৱালী জন্ম দিব পাৰে, সহজে ডাঙৰ হয় আৰু আতাইটকৈ ভালদৰে খাদ্য বস্তুক মাংসলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। গাহৰি পালনে এক বৃহৎ সংখ্যক মহিলা, আৰ্থিক ভাৱে অনগ্রসৰ লোক আৰু নিম্নশ্ৰেণীৰ যুৱক-যুৱতীক আৰ্থ-সামাজিক দিশত অৰিহণা যোগাব পাৰে। আন জীৱ-জন্তুৰ পালনৰ তুলনাত গাহৰি পালনে ধাৰাবাহিক ভাৱে লাভ দি থাকিব পাৰে।

### গাহৰি পালনৰ সুবিধাসমূহ :-

- ১। বংশ বৃদ্ধি :- গাহৰিয়ে একেবাৰতে কেইবাটাও পোৱালী জন্ম দিয়ে। গতিকে অতি সহজেই ইহঁতৰ বংশ বৃদ্ধি হয়।
- ২। দ্রুত বৃদ্ধি :- ভাল জাতৰ গাহৰি পুহি ঠিকমতে প্ৰতিপালন কৰিলে ৭-৮ মাহ বয়সতে ইহঁতৰ গুজন ৭০-৮০ কিলোগ্ৰাম হ'ব পাৰে।
- ৩। চুটি গৰ্ভধাৰণ কাল :- গাহৰিৰ গৰ্ভধাৰণ কাল মাত্ৰ ১১৪ দিন (৩ মাহ ৩ সপ্তাহ ৩ দিন) আৰু এজনী গাহৰিয়ে ১২ মাহৰ ভিতৰতেই গৰ্ভধাৰণ কৰিব পৰা অৱস্থা পায়। ইহঁতে এবছৰত দুবাৰ নহলেও দুবছৰত তিনি বাৰ পোৱালী জন্ম দিব পাৰে।
- ৪। এককালিন আৰু আবহুণিৰ বয় :- গাহৰি পোলনত হোৱা আবহুণিৰ বয় কম আৰু এবাৰ মাত্ৰ মূলধন ব্যয় কৰিয়েই একেবাৰে উৎপাদন পাই থাকিব পাৰি।
- ৫। শ্ৰম ব্যয় :- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে গাহৰি পালন কৰিলে শ্ৰম ব্যয় কম লাগে। ঘৰৰ মহিলা সকলেও গাহৰি পালন কৰিব পাৰে।
- ৬। কাৰিকৰী দক্ষতা :- গাহৰি পালনৰ বাবে বৰ উচ্চমানৰ কাৰিকৰী দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন নহয়। পালক জনৰ গাহৰি চোৱা চিন্তা কৰাৰ বাবে সামান্য ব্যৱহাৰিক জ্ঞান থাকিলেই হয়।
- ৭। বজাৰৰ চাহিদা :- অসম তথা উত্তৰা পূৰ্বাঞ্চলৰ অধিকাংশ লোকেই গাহৰিৰ মাংস খায়। সেয়ে ইয়াৰ বাবে বজাৰৰ অসুবিধা নহয়।
- ৮। জলবায়ু :- অসমৰ জলবায়ু গাহৰি পালনৰ বাবে উপযোগী।
- ৯। খাদ্য :- গাহৰিয়ে খাদ্যৰ বাবে অন্য জীৱ-জন্তুৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতা কৰিব লগীয়া নহয়। অন্য জীৱ-জন্তুৰ বাবে ব্যৱহাৰ নোহোৱা স্থানীয় ভাৱে পোৱা আৰু পেলনীয়া খাদ্য বস্তুৰ অধিকাংশই গাহৰিৰ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি।
- ১০। বেমাৰ :- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে পালন কৰি আৰু চাফ-চিকুনকৈ ৰাখি প্ৰতিষেধক চিচাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে গাহৰিৰ বিশেষ বেমাৰ-আজাৰ নহয়।
- ১১। সমন্বিত পাম :- মাছ পালনৰ লগত গাহৰি পালনৰ সমন্বয় ঘটালে গাহৰি আৰু মাছ পালন দুয়োটাৰ পৰা হোৱা লাভালাভৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায়।
- ১২। কমকৈ মাটি-বাৰী থকা মানুহেও গাহৰি পালন কৰিব পাৰে আৰু ব্যৱসায় হিচাপে লৈ সংসাৰ চলাব পাৰে।
- ১৩। অন্যান্য জীৱ-জন্তুৰ তুলনাত জীৱিত গাহৰিৰ পৰা ওলোৱা মাংসৰ পৰিমাণ (Dressing percentage) যথেষ্ট বেছি হয়।
- ১৪। আজিকালি গাহৰি পালনৰ বাবে বেংকবোৰে বিভিন্ন ঋণ (Loan) দিয়ে আৰু চৰকাৰেও আত্ম সহায়ক গোট খুলি গাহৰি পালন কৰিলে যথেষ্ট সহায় আগবঢ়ায়।

### গাহৰি পালন পদ্ধতি :-

সাধাৰণতে তিনিটা পদ্ধতিৰে গাহৰি পালন কৰিব পাৰি।

- (ক) মুকলি পদ্ধতি :- এই পদ্ধতিত গাহৰি বিলাক মুকলিত বান্ধি ৰাখি তাতে খোৱা-বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। আমাৰ প্ৰামাণ্যলত এটা-দুটা গাহৰি পালনৰ বাবে এই পদ্ধতিকে ব্যৱহাৰ কৰা হয়।
  - (খ) আবদ্ধ পদ্ধতি :- এই পদ্ধতিত গাহৰিক গড়ালত সম্পূৰ্ণ ভাৱে আবদ্ধ কৰি ৰখা হয় আৰু লানৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। বৈজ্ঞানিক ভাৱে গাহৰি পালনৰ বাবে এই পদ্ধতি উপযুক্ত আৰু প্ৰজনন পাম খুলিলে এই পদ্ধতি বিশেষ ভাৱে ব্যৱহাৰ হয়।
  - (গ) আধা আবদ্ধ পদ্ধতি :- এই পদ্ধতি মুকলি আৰু আবদ্ধ পদ্ধতিৰ মাজত পৰে। ইয়াত থকা-খোৱাৰ বাবে গড়ালৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় যদিও মাজে মাজে গাহৰিবোৰ এৰি দি মুকলি পথাৰত চৰাবোৱা হয়।
- এতিয়া তলত উল্লেখিত কথা কেইটাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গাহৰি পালনৰ বাবে যিকোনো এটা পদ্ধতি বাচি লব পাৰি। কথা কেইটা হ'ল –
- মাটি-বাৰীৰ উপলব্ধতা।
  - গাহৰি পামৰ আকাৰ, কিমান গাহৰি পুহিব আদি।
  - পাম খুলিব লগা ঠাই যিনিৰ বতৰৰ অৱস্থা।
  - পুহিব লগা গাহৰিৰ প্ৰকাৰ বা জাত।
  - গাহৰি পামৰ প্ৰকাৰ-মাংস উৎপাদন পাম নে পাজন পাম বা পোৱালী উৎপাদন পাম।

### গাহৰি পামৰ বাবে স্থান নিৰ্বাচন :-

গাহৰি পাম খোলাৰ বাবে স্থান বাচনি কৰোঁতে তলত উল্লেখিত বিষয়বোৰ বিবেচনা কৰিব লাগে –

- ১। বজাৰ :- গাহৰি, গাহৰিৰ মাংস, ইহঁতৰ খাদ্য, আহিলা, সা-সৰঞ্জাম আদি সামগ্ৰীৰ ক্ৰয়-বিক্ৰীৰ কাৰণে এখন সহজে, সুস্থিৰ আৰু নিয়মীয়া বজাৰৰ প্ৰয়োজন।
- ২। বসতিস্থল :- গাহৰিবোৰক যদি মুকলি ঘাঁহনি বা পথাৰত চৰিব দিয়া হয়, তেন্তে মানুহৰ বসতিস্থলৰ পৰা দূৰত পামখন বনোৱাৰোতা ভাল। কিন্তু গাহৰি আবদ্ধ পদ্ধতিত পুহি পাম ঘৰৰ ভিতৰতে ৰাখিলে পামখন ঘৰৰ পৰা বৰ দূৰত নৰনালেও হয়।
- ৩। পথ :- পাম সদায় মূল পথৰ পৰা সামান্য আঁতৰত কিন্তু বেছি দূৰত হোৱা অনুচিত।
- ৪। মাটিৰ ধৰণ :- নিৰ্বাচিত মাটিভোখৰ সদায় ওখ, সমতল আৰু ৰ'দ ঘাই হ'ব লাগে। পাহাৰীয়া বা এটলীয়া ঠাইত পামঘৰ কৰাটো ব্যয় বৰ্ধন হয়।
- ৫। মুকলি ঠাই :- পাম ঘৰৰ কাষত মুকলি ঠাই অকনমান থাকিলে ভাল, যাক গাহৰিৰ ব্যায়াম কৰোৱাৰ বাবে আৱশ্যক হয়।
- ৬। পানী :- বিপুল পানীৰ উৎস পামৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আৱশ্যকতা।
- ৭। বতাহ চলাচল :- ঠাইভোখৰ মুকলি সাকলি আৰু বতাহ চলাচলৰ সুবিধা থকা হ'ব লাগে।
- ৮। খাদ্য :- ওচৰতে প্ৰাকৃতিক ভাৱে গজা বনজ খাদ্য পোৱা, পেলনীয়া খাদ্যবস্তু আদি সংগ্ৰহ কৰাৰ সুবিধা থকা হ'লে ভাল।

- ৯। উদ্যোগৰ অৱস্থান :- বিঘাত্ৰ গেছ নিৰ্গত হোৱা উদ্যোগৰ কাষত এনে পাম বনাৰ নালাগে।
- ১০। নিষ্কাশণ ব্যৱস্থা :- পাম পৰিষ্কাৰ কৰোতে ওলোৱা মল-সূত্ৰৰ ভালকৈ নিষ্কাশণ হোৱাৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগে।

### গাহৰিৰ ঘৰ :-



- গাহৰিৰ বাবে বৰ বেছি দামী ঘৰ বা আহিলাৰ দৰকাৰ নহয়, কিন্তু ইহঁতে যাতে অত্যন্ত গৰম, চৈচা, সেমেকা আদি প্ৰকোপত নপৰে তালৈ লক্ষ্য ৰাখি ঘৰটো বনাৰ লাগে।
- ঘৰটো বাহ-বেত, খেৰ আদিৰে যথাসম্ভৱ কম খৰচতে সাজিব লাগে, কিন্তু ঘৰৰ বিভিন্ন অংশ যাতে মজবুট হয় তাৰ প্ৰতি চকু দিব লাগে।
- ঘৰৰ মজিয়াখন শুকান, পকা, বহুতা আৰু এফালে এটলীয়া হ'ব লাগে।
- ঘৰৰ ছালত খেৰ ধানৰ নৰা, ঢকৌপাত আদি লগাব লাগে, যাতে ঘৰটো সহজে গৰম নহয়।
- গাহৰি ঘৰৰ বেৰবোৰ ৪-৫ ফুট উচ্চতাৰ হ'ব লাগে। তাৰে ৩-৪ ফুট ইটোৰে বনাই ওপৰৰ এফুটত এক ইঞ্চি ব্যাসৰ লোৰ বদ বা পাইপ লগাই দিব লাগে। বেৰবোৰ শক্তি শালী আৰু মিহি হ'ব লাগে।
- ঘৰটোৰ বেৰত পকাৰে দানা-পানীৰ পাত্ৰ বনাই ৰ'ব লাগে।
- পকাৰ মজিয়াৰ এটলীয়াকৈ ৰখা ফালে এটা নলাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যাতে মজিয়া ধূলে সেইফালে পানী ও মল-সূত্ৰবোৰ ওলায় যায়। ওচৰত পুখুৰী থাকিলে নলা পুখুৰীৰ লগত সংযোগ কৰি দিব লাগে, যাতে মল-সূত্ৰবোৰ মাছৰ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ হয়।
- বাঢ়ীয়া অৱস্থাৰ গাহৰি একোটাৰ গড়ে ১০-১৫ বৰ্গফুট, আদৰ্শীয়া অৱস্থাৰ একোটা গাহৰিক ৩০-৪০ বৰ্গফুট, মতা ঘাই গাৰি একোটাৰ ১০০ বৰ্গফুট আৰু একোজনী গাভিনী গাহৰিক গড়ে ১০০ বৰ্গফুট পৰিমাণ মজিয়াৰ দৰকাৰ হয়। আবদ্ধ পদ্ধতিৰে ৰাখিলে ওপৰত উল্লেখিত সম পৰিমাণৰ জেপা প্ৰতিটো গাহৰিৰ বাবে গড়ালৰ বাহিৰত বেৰি দিব লাগে।
- একোটা কোঠাত ১০ টা পৰ্যন্ত বাঢ়ীয়া গাহৰি ৰাখিব পাৰি। কিন্তু মতা ঘাই গাহৰি আৰু গাভিনী গাহৰি এটা কোঠাত এটাকৈহে ৰাখিব লাগে।

- পোৱালী জগোৱা কোঠাৰ এফালে এডোখৰ আচুতীয়া ঠাই ৰাখিব লাগে য'ত মাজজনী সোমাব নোৱাৰে। বেৰৰ পৰা ৯ ইঞ্চি আতৰত আৰু মজিয়াৰ পৰা ৯ ইঞ্চি উচ্চতাত এডাল বাঁহ, কাঠ বা লোৰ পাইপ দীঘে দীঘে লগাই দি এই ঠাইখিনি তৈয়াৰ কৰিব লাগে।
- গাহৰিৰ ঘৰটোৰ দিশ দীঘলীয়াকৈ উত্তৰা-দক্ষিণ হোৱা উচিত, যাতে আগবেলা ঘৰটোৰ এফালে আৰু পিছবেলা আনফালে ভালদৰে বদ পৰি ঘৰটো শুকান হৈ থাকে।

### গাহৰিৰ জাত :-

অসমৰ জলবায়ুৰ লগত সহজে খাপ খাব পৰা ব্যৱসায়িকভাৱে পুহিব পৰা গাহৰি জাত কেইটা হৈছে –



- ১। হেম্পচায়াৰ (Hampshire) :- ইহঁতৰ বং কলা। বুকুৰ অংশ আৰু আগভৰি দুটা সামৰি এডাল বগা বঙৰ পটা থাকে। ইহঁতৰ কান দুখন চুটি আৰু ঠিয় হয়।
- ২। লাৰ্জ ব্লেক (Large Black) :- এই জাতৰ গাহৰিৰ বং সম্পূৰ্ণ ক'লা আৰু কান দুখন চকুৰ ওপৰত পৰা। শৰীৰ দীঘলীয়া আৰু আঁটিল।
- ৩। ইয়ৰ্কচায়াৰ (Yorkshire) :- বগা বঙৰ এই গাহৰিত কেতিয়াবা সামান্য কলা বঙৰ ফুট বা দাগ থাকিব পাৰে। ইহঁতৰ কান দুখন ঠিয় হয়।
- ৪। লেণ্ডৰেচ (Landrace) :- ইহঁতৰ বৰণ বগা আৰু দেহটো সামান্য দীঘলীয়া আৰু কাণ দুখন চকুৰ ওপৰেদি হালি যোৱা।
- ৫। ঘুংগ্ৰু (Ghungroo) :- কলা বৰণৰ গাহৰিৰ এই জাতটো পশ্চিম বংগত উৎপত্তি হোৱা। ইয়াৰ মুখকন চুটি আৰু বৃদ্ধিৰ হাৰ খৰটকীয়া হয়।
- ৬। টি এণ্ড ডি (T & D) :- কলা বঙৰ এই জাতটো কাৰখণ্ডত উৎপত্তি হোৱা। তুলনামূলক ভাৱে নতুন এই জাতটোৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ ভাল আৰু কৃষকৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে।

### পামৰ বাবে গাহৰি নিৰ্বাচন :-

মাংস উৎপাদনৰ বাবে যদি গাহৰি পোহা হয় আৰু প্ৰতিবাৰতে যদি বেলেগ বেলেগ উৎসৰ পৰা নতুন পোৱালী কিনা হয় তেন্তে লক্ষ্য কৰিব লগা কথা কেইটা হৈছে –

- ▶▶ পোৱালীৰ বয়স দুমাহৰ ওপৰ হ'ব লাগে।
- ▶▶ পোৱালী নিৰোগী, সতেজ, স্বাস্থ্যবান হ'ব লাগে।

- ▶▶ সিহঁতৰ মাক-বাপেকৰ বুদ্ধি স্বৰতকীয়া হ'ব লাগে।
- ▶▶ বাহ্যিক অংগসমূহ ঠিকমতে থাকিব লাগে।
- ▶▶ মিহেতু মতা গাহৰিৰ বুদ্ধি তুলনামূলকভাৱে বেছি, সেয়ে কিনাৰ সময়ত মতা গাহৰিক অগ্রাধিকাৰ দিব লাগে।

### প্ৰজননৰ বাবে গাহৰি নিৰ্বাচন :

#### (ক) মাইকী গাহৰিৰ নিৰ্বাচন :

- বয়স কমেও চাৰি মাহ হ'ব লাগে আৰু বহুত বয়সীয়ালা হ'ব নালাগে।
- আকাৰ আৰু ওজন বয়সৰ অনুপাতিক হ'ব লাগে।
- মাকৰ প্ৰজনন ক্ষমতা বেছি থাকিব লাগে।
- দেখাত মাকী গাহৰিৰ দৰে সৰু ডিঙিৰ, সক্ৰিয় আৰু উজ্জ্বল চকুৰ হ'ব লাগে।
- নূন্যতম ছয়ঘোৰ স্তন থকা হ'ব লাগে আৰু স্পষ্ট হ'ব লাগে।
- ভৰিসমূহ শক্তিশালী, যথাসম্ভৱ দীঘল আৰু চাৰি ভৰিৰ ওপৰত সঠিকভাৱে থিয় দিব পৰা হ'ব লাগে।
- গাহৰিজনী নিৰোগী হ'ব লাগে, ছালখন কোমল আৰু নোমবোৰ মিহি হ'ব লাগে।
- গাহৰিজনীৰ ওচৰলৈ মানুহ গলে চকু খাই উঠা ধৰণৰ হ'ব নালাগে, যি গৰ্ভাৱস্থাৰ বাবে ক্ষতিকাকৰ হয়।
- আগঠেঙৰ পিছৰ অংশ অৰ্থাৎ Heart Girth ডাঙৰ হ'ব লাগে।

#### (খ) মতা গাহৰিৰ নিৰ্বাচন :

- ▶ বয়স ৬ মাহ মানৰ ওপৰ হ'ব লাগে, অৰ্থাৎ মাইকী গাহৰিতকৈ বয়স নূন্যতম ২ মাহ মান বেছি হ'ব লাগে কিন্তু বুঢ়া হ'ব নালাগে।
- ▶ মাইকী গাহৰি বিলাকৰ সৈতে একে মাকৰ হ'ব নালাগে।
- ▶ প্ৰজনন অংগ অস্পষ্ট বা কোনো অণুৰূপ নথকা হ'ব নালাগে।
- ▶ ভৰি কেইখন শক্তিশালী তথা সঠিক হোৱা উচিত।
- ▶ পুৰুষ যেন গাঠীয়াতা থাকিব লাগে। ডিঙি অংশ ডাঙৰ, শক্তিশালী আৰু দেখিলেই মতা যেন লাগিব লাগে।
- ▶ সহজতে ভয় খোৱা আৰু অতি শান্ত প্ৰকৃতিৰ হ'ব নালাগে।
- ▶ দেহৰ ছালখনত কৌচ নথকা, কোমল, নিমজ আৰু নোমবোৰ মিহি আৰু সমান হ'ব লাগে।

### গাহৰিৰ প্ৰজনন :

- উন্নত জাতৰ বা বৰ্ণসংকৰ গাহৰি পোৱালীক ভালদৰে খাদ্য যোগান ধৰিলে ৬-৮ মাহ বয়সত (৫০ কিঃ গ্ৰাম ওজন হোৱাৰ পাছত) পূৰ্ণতা পায় আৰু প্ৰজননৰ উপযোগী হয়।
- মতা গাহৰি পোৱালীবোৰ ৮-১০ মাহ মানত প্ৰজননৰ উপযোগী হয় আৰু প্ৰজননৰ ২-৩ মাহ আগৰ পৰা ইহঁতক বেলেগে ৰাখিব লাগে।
- মাইকী গাহৰি পোৱালীক প্ৰথমবাৰ গৰমত আহোতে প্ৰজনন কৰাব নালাগে, তিনি নম্বৰ বাৰ গৰমত আহোতেহে প্ৰজনন কৰাব লাগে।

- সচৰাচৰ গাহৰি প্ৰতি ২০-২১ দিনৰ মূৰে মূৰে গৰমত আহে আৰু ই এদিনৰ পৰা তিনিদিন পৰ্য্যন্ত থাকে। এদিনৰ বাবে গৰমত থকা গাহৰিক দিনটোৰ শেষৰ ফালে দুদিনৰ বাবে গৰমত থাকিলে দ্বিতীয় দিনৰ প্ৰথম ভাগত আৰু তিনি দিনৰ বাবে গৰমত থাকিলে দ্বিতীয় দিনৰ প্ৰথম ভাগত আৰু তৃতীয় দিনটোতো এবাৰকৈ প্ৰজনন কৰাব লাগে।

### গাহৰি গৰম হোৱাৰ লক্ষণ :-

- গাহৰি জনীৰ বাহ্যিক জননাংগ ফুলি উঠে, ৰঙা পৰে আৰু গৰম হৈ থাকে
- যেনিছাৰৰ পৰা ডাঠ তৰল পদাৰ্থ ওলায়, খোৱা-বোৱাৰ পৰিমাণ কমি যায়।
- গাহৰিজনী চঞ্চল হৈ উঠে আৰু মাজে মাজে এক সুকীয়া বিশেষ ধৰণৰ মাত দিয়ে। আন মতা বা মাইকী গাহৰিৰ জননাঙ্গত নাক লগায় আৰু গাত উঠিবলৈ চেষ্টা কৰে।
- গাহৰিজনীয়ে বেৰত পিঠিখনৰ পিছ অংশটো সামান্য হেচা মাৰি ধৰি শান্ত হৈ ৰৈ থাকে যাতে অন্য গাহৰি সহজেই ইয়াৰ গাত উঠিব পাৰে।
- গাহৰিজনী গৰম হোৱাৰ শীৰ্ষতম মুহূৰ্ত্তত যিকোনো প্ৰকাৰে মতা গাহৰিক গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে সাহু হৈ থাকে। এনে গাহৰিৰ পিঠিৰ পিছৰ অংশত সামান্যভাৱে স্পৰ্শ কৰিলেই ই প্ৰজননৰ বিশেষ ভংগীমাত ৰব।

### গাহৰিৰ প্ৰজননৰ সময়ত মনত ৰাখিবলগীয়া কথা :-

- গাহৰি গৰম হ'লে গাহৰিৰ জাকটোৰ লগত মতা গাহৰিটো এৰি দিব নালাগে। পাল দিয়াৰ নিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থা লৈ অকলশৰে এটা কোঠাত এৰি দিব লাগে।
- এজনী গৰম গাহৰিৰ বিপৰীতে এটাতকৈ বেছি মতা গাহৰি লগাব নালাগে।
- প্ৰজননৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা মতাটো অতি কম বয়সীয়া আৰু বৰ বুঢ়া হ'ব নালাগে।
- মতা গাহৰিটোক দিনটোত এবাৰ মাত্ৰ পাল দিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে।
- মাইকী গাহৰিকো এবাৰ পাল দিলেই হয় যদিও তিনিদিনমান গৰমত থাকিলে তৃতীয় দিনা আৰু এবাৰ প্ৰজনন কৰাব পাৰি। দুয়ো বাৰতে একোটা মতাকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে।
- মতাটোক দানা খুৱাবৰ পাছতেই প্ৰজননৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। দানা দিয়াৰ আগতে বা দানা দিয়াৰ পিছত ব্যৱধানতহে প্ৰজননৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে।

### গাভীনী গাহৰিৰ যতন :-

- ১। গাহৰি গৰ্ভাধাৰণ কাল ১১৪ দিন (৩ মাহ ৩ সম্প্ৰাহ ৩ দিন)। গৰ্ভাৱস্থাৰ শেষৰ এমাহ মান সময় ভালদৰে যতন ল'ব লাগে।
- ২। গাহৰিজনী অন্য গাহৰিৰ লগত জাকত নাৰাখি অকলসবীয়াকৈ ৰাখিব লাগে, যাতে অন্যৰ লগত কাজিয়া নকৰে।
- ৩। বহুদূৰ খোজ কঢ়া, জপিওৱা বা সৰু জেগা বা ফুটাৰে সৰকিবলৈ বাধ্য কৰাব নালাগে।
- ৪। জগাৰ ৩ সপ্তাহ মান আগতে এপালি পেলুৰ দৰব খুৱাব লাগে।





- ৫। এই অবস্থাত গাহবিজনীর বাবে প্রতিদিনে অলপ সময়ৰ কাৰণে ব্যায়ামৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে।
- ৬। গৰ্ভাৱস্থাৰ শেষৰ ফালে খাদ্যৰ পৰিমাণ বঢ়াই দি যথেষ্ট প্ৰটিন জাতীয় খাদ্য (মাছৰ গুড়ি, পেলনীয়া মাছে খলিহে আদি) দিব লাগে আৰু বেছি চৰ্বি থকা খাদ্য দিব নালাগে।
- ৭। দনাত অলপ খনিজ লবন যেনে- কেলছিয়াম, ফচফৰাছ আয়োডিন, লৌহ মৌল আৰু ক আৰু ও খাদ্যপ্ৰাণ (Vitamin A and E) যোগান ধৰিলে ভাল।
- ৮। পোৱালী দিয়াৰ এসপ্তাহমান আগৰ পৰা এটা আহল বহল পৰিষ্কাৰ কোঠাত ৰাখিব লাগে। এই কোঠালৈ অনাৰ আগতে গাহবিজনীকো পটাচ পানী বা নিমপাত সিজোৱা পানীৰে ভালদৰে চফা কৰি লব লাগে।
- ৯। জগাৰ সজ্জাৰনা থকা দিনটোৰ তিনিদিন মান আগৰ পৰা দনাত সহজে হজম হোৱা ঘেৰঁৰ ভূচি জাতীয় উপাদানৰ পৰিমাণ বঢ়াই দিব লাগে।
- ১০। শেষৰ দুদিনত দানাৰ পৰিমাণ কমাই দিব লাগে।
- ১১। পোৱালী জন্মৰ ১২ ঘণ্টা মান আগৰ পৰা গাহবিজনীয়ে বাঁহ বনাৰৰ চেষ্টা কৰে। সেয়ে এইখিনি সময়ত পাবিলে ধানখেৰ, বস্তা আদি ওচৰত ৰাখিব লাগে।
- ১২। অতিপাত ঠাণ্ডা হ'লে কৃত্ৰিম ভাবে তাপৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে।
- ১৩। পোৱালী জন্মৰ ১২-২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত দানা খাবলৈ নিদিয়া ভাল। কুহমীয়া গৰম পানী পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে খুৱাব লাগে। বৰকৈ দানা বিচাৰিলে অলপ ঘেৰঁৰ ভূচি জাতীয় দানা দিব লাগে।
- ১৪। পোৱালী দিয়াৰ শেষ হ'লে গাহবিজনী পিছফালৰ অংশ আৰু ওহাৰখন পটাছ পানী বা নিমপাট সিজোৱা পানীৰে ভালদৰে হুই দিব লাগে।

### সদ্যজাত পোৱালীৰ যতন :

- পোৱালী জন্মৰ সময়ত এজন ৰখীয়াই ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰি থাকিব লাগে আৰু ওলোৱাৰ লগে লগে প্ৰতিটো পোৱালীক এখন কোমল, চফা আৰু শুকন কাপোৰেৰে পৰিষ্কাৰ কৰি শুকান ঠাই এটুকুৰাত ৰাখিব লাগে।
- পোৱালী জন্মৰ সময়ত এজন ৰখীয়াই ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰি থাকিব লাগে আৰু ওলোৱাৰ লগে লগে প্ৰতিটো পোৱালীক এখন কোমল, চফা আৰু শুকন কাপোৰেৰে পৰিষ্কাৰ কৰি শুকান ঠাই এটুকুৰাত ৰাখিব লাগে।
- পোৱালীৰ নাভিত লাগি থকা



নাৰীডাল ১-২ ইঞ্চিমান আঁতৰত কাটি পেলাব লাগে আৰু তাত টিনচাৰ আয়োডিন লগাই দিব লাগে। নাৰী কাটিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ব্লেড বা কেঁটাখনো টিনচাৰ আয়োডিনেৰে চফা কৰি লব লাগে।

- পোৱালী দিয়া তথা মাক আৰু পোৱালীক পৰিষ্কাৰ কৰা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতে পোৱালীক মাকৰ ফেছ খুৱাব লাগে। ই অতি পুষ্টিৰ, সেয়ে সকলো পোৱালীয়ে যাতে সমভাৱে খাবলৈ পায় তাক নিশ্চিত কৰিব লাগে।
- ফেছ তথা গাখীৰ সমভাৱে খুৱাবলৈ আৰু বাঁহটোৰ সৰু পোৱালীকেইটাক বেছিকৈ খুৱাবলৈ সিহঁতক মাকৰ নুবুৰ ফালৰ বাত কেইটাট আৰু সৰল ডাঙৰ পোৱালী কেইটাক পিছফালৰ বাত কেইটাট খাবলৈ দিব লাগে।
- পোৱালীৰ বেছি দাঁতবোৰ জন্মৰ পিছদিনাই দাঁত কটা যন্ত্ৰৰে কাটি পেলাব লাগে। অন্যথাই সেইবোৰে মাকৰ ওহাৰত যাঁ লগাই আৰু নিজৰ মাজতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়।
- মাকৰ গাৰ হেচাত পৰি যাতে পোৱালীয়ে দুখ নাপায় আৰু মৃত্যু নহয় তাৰবাবে গড়ালটোত অলপ জেগা বেৰি দিব লাগে য'ত সিহঁত সোমাব পাৰে কিন্তু মাক সোমাব নোৱাৰে।
- পোৱালীৰ সংখ্যা অনুপাতে মাকক অতিৰিক্ত দানা দিব লাগে আৰু দুসপ্তাহ বয়সৰ পোৱালীক তোলানীয়া দানা খাবলৈ দিব লাগে।
- বক্তহীনতা ৰোগৰ প্ৰতিবোধৰ বাবে ৪ দিন আৰু ১৪ দিন বয়সত লৌহ মৌলৰ (ইনফেবণ) বেছি দিয়াৰ লাগে।
- সৰ্টৰ বাবে নলগা মতা পোৱালীক ১-২ মাহ বয়সত ৰখী কৰাব লাগে।

### প্ৰজননৰ বাবে ৰখা মতা গাহবিৰ যতন :

- ▶ এনে গাহবিৰ অকলশৰে ওখ বেৰৰ (৫ ফুট উচ্চতাৰ) গড়ালত ৰাখিব লাগে। সৰু গাহবিৰ লগত ৰাখিব নালাগে।
- ▶ বেছি প্ৰটিন যুক্ত অথচ কম চৰ্বিযুক্ত আৰু অধিক 'ক' খাদ্যপ্ৰাণ যুক্ত খাদ্য দিব লাগে।
- ▶ কম বয়সীয়া মতা গাহবিৰ অলপ বয়সীয়াল অভিজ্ঞতা থকা মাইকী গাহবিৰ লগত প্ৰজনন কৰাব লাগে।
- ▶ দিনটোত এবাৰহে প্ৰজনন কৰাব লাগে। পৰাপক্ষত এসপ্তাহত তিনিবাৰ মানহে প্ৰজননৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে।
- ▶ দনা খুণ্ডাৰ পাছতে প্ৰজননৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। ওজন বেছি হৈ গলে (১০০ কিঃ গ্ৰামৰ অধিক) খাদ্যৰ পৰিমাণ কমাই দিব লাগে।
- ▶ সৰু আকাৰৰ মাইকী গাহবিৰ সৈতে ডাঙৰ মতাৰ প্ৰজনন কৰাবলৈ প্ৰজননসজা (Breeding Crate) ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি।
- ▶ নিয়মিত ভাবে গা ধুৱাই চফা কৰিব আৰু ভৰিত দীঘল নোম থাকিলে সেইবোৰ সৰু সৰু কৈ খাটি থাকিব লাগে।

## গাহৰিৰ খাদ্য :-

- গাহৰিয়ে সকলো ধৰণৰ খাদ্যকে খায়। বিভিন্ন শাক পাচলিকে ধৰি ঘৰৰ পেলনীয়া খাদ্য বস্তুবোৰক ইহঁতৰ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। বজাৰত গাহৰিৰ বাবে সুখম দানা কিনিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু ইয়াৰ দাম বৰ বেছি আৰু ইয়াৰ উপাদানবোৰবোৰো বিশ্বাসযোগ্যতা কম হয়। সেয়ে ঘৰতে বা স্থানীয় ভাবে উপলব্ধ উপাদান যেনে তুঁহ গুৰি, মটকৈ, চাপৰ, মাছৰ গুড়ি, চাউলৰ মল আদি ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰতে এই সুখম দানা তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগে।
- বিভিন্ন বয়সৰ গাহৰিৰ দানা প্ৰস্তুতি কৰোতে উপাদানবোৰ অনুপাত তলত দিয়া ধৰণে ৰাখিব পাৰি।

গাহৰিৰ শ্ৰেণী	মটকৈ/চাউলৰ মল		ঘেহুৰ গুড়ি		খলিহৈ		মাছৰ গুড়ি		খনিজ পদাৰ্থ		নিমখ	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
পোৱালী	৫৫	১৪.৫	২০	৮	২	০.৫						
বাঢ়নীয়া	৪৮	২৭.৫	২০	৫	২	০.৫						
পূৰ্ণ বয়স্ক	৩৫	৩৭.৫	২০	৫	২	০.৫						

- গাভিনী গাহৰিক প্ৰায় আঠে মাহ পিছৰ পৰা খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ যতন ল'ব লাগে। কিয়নো এই সময়ত গাহৰিজন্মৰ নিজৰ পৰিপুষ্টিৰ বাবে অধিক খাদ্যৰ দৰকাৰ হয়। তাৰোপৰি গৰ্ভত বাঢ়ি অহা পোৱালীৰ বাবে আৰু পোৱালী দিয়াৰ পাছত গাৰীৰ যোগাবলৈও দেহত যতন্ত পুষ্টি সঞ্চিত কৰি ৰাখিব লাগে।
- পিয়ন দিয়া গাহৰিক আদহীয়া গাহৰিৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা দানা ই যথেষ্ট। প্ৰতিটো পোৱালীৰ বাবে ২০০ গ্ৰামকৈ অতিৰিক্ত দানা খুৱাব লাগে। দহটা পোৱালী দিয়া এজনী গাহৰিক মুঠ ৫-৬ কিলোগ্ৰাম দানা দিব লাগে।
- সঁচৰ মতা গাহৰিকো আদহীয়া গাহৰিৰ দানা দিলেই হয়। এটা গাহৰিক দিনে ২.০-২.৫ কিঃ গ্ৰাম দানাৰ প্ৰয়োজন। ১০০ কিলোগ্ৰামৰ ওপৰত ওজন হোৱা গাহৰিক দানাৰ পৰিমাণ কমাই দিব লাগে।
- জগাৰ-দুসপ্তাহমান পিছৰ পৰা পোৱালীক অলপ অলপ দানা খুৱাব লাগে যাতে, সোমকালে সিহঁতক মাৰৰ পৰা পৃথক কৰিলেও দেহৰ গঠন ডাল হয় আৰু বিশেষ ক্ষতি নহয়।

## গাহৰিৰ খাদ্যত ব্যৱহৃত অপৰম্পৰাগত উপাদান সমূহ :-

গাহৰিৰ খাদ্যৰ নাটনিৰ লগতে যিখিনি পোৱা যায় সেইবোৰবোৰো দৈনিক মূল্য বৃদ্ধিয়ে গাহৰি পালনত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিলে। গতিকে ঠাইবোৰত স্থানীয় ভাবে পোৱা উপাদান বোৰৰ উপৰি পৰম্পৰাগত ভাবে ব্যৱহাৰ নোহোৱা খাদ্য বস্তু খুৱাই খাদ্যত হোৱা ব্যয়ৰ পৰিমাণ কমাব পাৰি। গাহৰিক খুৱাব পৰা এনে এটা উপাদান হৈছে- কল গছ। ইয়াৰ পৰা পোৱা পকা কল পোনে পোনে আৰু কেচাকল ও কলপাত, বাকলি, গা-গছ আদি সিজাই

দানাৰ লগত দিব পাৰি। তেনেদৰে কেচা ও পকা আমিতা, অমিতাৰ বাকলি, ফুলকৰি, গুলকৰি, বন্ধা কৰিকে ধৰি বিভিন্ন শাক-পাচলিবোৰ, বদত শুকুৱাই লোৱা পানী মেটেকা, আলু, মিঠা আলু, শিমলু আলু, কচু, কচুৰ গছ, কলমো, বিভিন্ন লতা জাতীয় গছ আৰু ইয়াৰ পাত, বিলাহি আৰু সাল, আজাৰ আৰু নাহৰৰ গুটি আদি কম পৰিমাণত অন্য খাদ্যৰ লগত সিজাই খুৱাব পাৰি। পাট, এড়ি বা মুগা পলুৰ লেটা, ব্ৰইলাৰ বা অন্য কুকুৰা কাটোতে ওলোৱা অৱশিষ্ট অংশবোৰ আৰু ইহঁতৰ নাৰী ভেক আদি ভালদৰে চফা কৰি সিজাই খুৱালে গাহৰিয়ে যথেষ্ট প্ৰতিন বা মাসেহাৰ পায়। কঠাল, মাটি কঠাল, আম, মধুৰি আৰু অন্যান্য ফল-মূল আৰু সেইবোৰ খাওঁতে ওলোৱা বাকলি বা অৱশিষ্টবোৰ, বান্ধনি ঘৰ বা হোটেলত ওলোৱা বিভিন্ন শাক-পাচলিৰ অৱশিষ্টবোৰ গাহৰিৰ দানাতে মিহলাই সিজাই খুৱাব পাৰি।

এনেদৰে ঠাই বিশেষে ওপলব্ধ বিভিন্ন দানাৰ উপাদানবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোতে এটা কথাত বিশেষ সাৱধান হ'ব লাগে যে, কোনো উপাদানকে একেৰাৰে বা এদিনতে সলাই পেলাব নালাগে। অলপ অলপকৈ আৰম্ভ কৰি নিৰ্দিষ্ট উপাদানটো লাহে লাহে বঢ়াই যাব লাগে আৰু অপৰম্পৰাগত উপাদানবোৰ পৰাপক্কত সদায় সিজাই (১০০° ছেণ্টিগ্ৰেডত ১০ মিনিটৰ বাবে) খুৱাব লাগে আৰু উপাদান বিশেষে ইয়াৰ পৰিমাণ মুঠ দানাৰ ৫-২৫ শতাংশ মানহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে।

## গাহৰিৰ বিভিন্ন ৰোগ :-

ভালদৰে প্ৰতিপালন কৰি উচিত পৰিমাণত খাদ্য খুৱালে আৰু সময়মতে প্ৰতিশোধক ছিটাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে গাহৰিৰ বেমাৰ আজাৰ কম হয়। সচৰাচৰ হোৱা গাহৰিৰ বেমাৰ কেইটা হ'ল :-



- টেটুৰা :-** এই ৰোগ বেট্টেৰীয়াৰ দ্বাৰা হয়। গাহৰিৰ তীব্ৰ জ্বৰ উঠে আৰু নাক আৰু মুখৰ পৰা তেজ ওলায় আৰু মৃত্যু মুখত পৰে। ছিটা দি এই ৰোগৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি। এই ৰোগত মৰা গাহৰি দকৈ পুতি ধব লাগে আৰু কাউৰী বা শগুণক কেতিয়াও খাবলৈ দিব নালাগে। ইয়াৰ কোনো চিকিৎসা নাই।
- গল ফুলা :-** বেট্টেৰীয়াৰ দ্বাৰা হোৱা এই ৰোগত আক্ৰান্ত গাহৰিৰ তীব্ৰ জ্বৰ উঠে আৰু জিভাৰ গুৰি ভাগ উখাই ডিঙিৰ অংশ ফুলি উঠে আৰু বেকা হৈ যায়। বেমাৰ হোৱাৰ লগে লগে ছালফাডিমিডিন জাতীয়া এন্টিবায়োটিক ব্যৱহাৰ কৰি চিকিৎসা কৰিলে গাহৰি বাচিব পাৰে। অন্যথাই এই ৰোগৰ প্ৰতিষেধক ছিটা দিব লাগে।